

UČINKOVITOST BIOLOŠKI AKTIVNIH SASTAVNICA MATIČNE MLIJEČI: ANALIZA I STANDARDIZACIJA

Nada ORŠOLIĆ

Zavod za animalnu fiziologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Primljen u studenomu 2012.
CrossCheck u rujnu 2013.
Prihvaćen u siječnju 2013.

Funkcionalna hrana postala je važan sektor u promicanju zdravstvenih prednosti hrane preko njenih funkcionalnih sastojaka sadržanih u ovim proizvodima. Posljednjih godina povećano je zanimanje potrošača i prehrambene industrije ne samo za funkcionalne sastojke hrane nego i za način na koji mogu pomoći u održavanju ljudskoga zdravlja. Mišljenje da prehrana ima važnu ulogu u sprečavanju i liječenju bolesti široko je prihvaćeno. Brojni literaturni podatci upućuju na to da pčelinji proizvodi, uključujući matičnu mlijec, mogu imati blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje. Matična je mlijec pčelinji proizvod s brojnim biološki aktivnim sastojcima zdrave hrane. Izlučevina je posebnih žlijezda (hipofaringealnih i mandibularnih) koju pčele radilice (*Apis mellifera* L.) koriste za hranjenje matice i ličinki. Matična mlijec sadrži znatnu količinu proteina, slobodnih aminokiselina, lipida, vitamina i šećera. Njene su karakteristične sastavnice bioaktivne tvari, primjerice *trans*-10-hidroksi-2-decenska kiselina, antibakterijski proteini, i protein mase 350 kDa protein, nazvan apisin, koji stimulira proliferaciju ljudskih monocita. Matična mlijec pokazuje brojne fiziološke i farmakološke učinke u sisavaca, uključujući vazodilataciju i sniženje krvnog tlaka, sniženje vrijednosti kolesterolja, usporavanje procesa starenja, antioksidativnu aktivnost, imunomodulacijski te protuupalni, antimikrobnii, estrogeni, antiosteoporozni i protutumorski učinak. Ublažavanje simptoma menopauze također je jedan od povoljnijih učinaka matične mlijeci. Ovaj pregledni članak upućuje na molekularne mehanizme uključene u razvoj pojedinih poremećaja te na odnos između matične mlijec i raznovrsnih bolesti na temelju dosadašnjih rezultata različitih *in vivo* i *in vitro* istraživanja. Rad također opisuje tumačenja mogućih mehanizama višestrukih korisnih učinaka matične mlijec u borbi protiv starenja i komplikacija povezanih sa starenjem. Osim toga, navode se i preporuke o definiranju standarda kakvoće matične mlijec s obzirom na to da rezultati analize ovoga pčelinjega proizvoda upućuju na značajne razlike u sastavu i djelotvornosti svježih i dehidriranih uzoraka.

KLJUČNE RIJEČI: funkcionalna hrana, kakvoća i standardizacija, kemijski sastav, pčelinji proizvod

Danas se u Evropi sve više koristi pojam „funkcionalne hrane“, pod kojim se podrazumijeva sva hrana s biološki aktivnim djelovanjem koja pomaže očuvanju zdravlja i utječe na pojedine tjelesne funkcije. Funkcionalna je hrana preko svojih bioloških aktivnih sastavnica važan čimbenik u održavanju ljudskoga zdravlja; njena se važnost posebice očituje u održavanju homeostaze organizma, dobrobiti za organizam, uključujući kvalitetniji život, u sprječavanju

ili liječenju lakših bolesti, održavanju ravnoteže razine biološki važnih tvari u organizmu, primjerice hormona, vitamina, aminokiselina i dr., te u održavanju mikroflore probavnog sustava i količine slobodnih radikala – glavnih uzročnika mnogih kroničnih patoloških stanja i bolesti.

Funkcionalna hrana može biti prirodna ili dobivena uklanjanjem ili izmjenom jedne ili više njenih sastavnica. Neke sastavnice mogu biti dodane hrani

kako bi povećale "funkcionalnost ili dobrobit" namirnica; među njima su omega-3 masne kiseline, vitamini, probiotici, vlakna, biljni dijelovi ili sastavnice iz biljaka i bioaktivni peptidi i fitosteroli (1). U hranu s potencijalno zdravstvenim prednostima svrstava se i hrana podrijetlom iz košnice: med, propolis, pčelinji kruh, pelud i matična mlijec. Matična mlijec (MM) jedan je od najcenjenijih pčelinjih proizvoda te se kao najatraktivnija funkcionalna hrana može koristiti i u medicini kao ljekoviti pripravak, posebno u dijetetici i kozmetici.

Mlijec je izlučevina posebnih žlijezda (hipofaringealnih i mandibularnih) koju pčele (*Apis mellifera* L., Apidae) koriste za hranjenje matice i ličinki. Tri su tipa mlijeci: radilička mlijec, matična mlijec i trutovska mlijec. Mlijec je bijele boje, kiselog pH (4,5 do 5,0) i specifična okusa. Smatra se da je diferencijacija jajašca u maticu ili radilicu posljedica različitog načina hranjenja ličinki s mlijeci (2). U matičnoj mlijeci ima deset puta više pantotenske kiseline, biopterina i neobiopterina nego u radiličkoj i trutovskoj mlijeci. Tijekom razvoja ličinki radilica i trutova mijenja se odnos glukoza/fruktoza od 0,1 do 0,7, a u matičnoj mlijeci cijelo vrijeme ostaje isti i iznosi 1,2 do 2,5. Kamakura (2) jasno je pokazao da dimorfizam jajašca u maticu ili radilicu ne ovisi o genetskim razlikama nego o uzimanju matične mlijeci. Diferencijaciju pčelinje ličinke u maticu potiče protein rojalaktin (mase 57 kDa), sadržan u matičnoj mlijeci. Rojalaktin povećava veličinu tijela i razvoj jajnika i skraćuje razvojno razdoblje pčela. Rezultati istraživanja pokazali su da rojalaktin aktivira p70 S6 kinaze odgovorne za povećanje tjelesne veličine, povećava aktivnost mitogenom aktivirane protein kinaze skraćujući razvojno razdoblje, te povećava titar juvenilnih hormona odgovornih za razvoj jajnika. Učinak rojalaktina u procesu diferencijacije pčelinje ličinke u maticu temelji se na signalnom putu posredovanom preko receptora epidermalnoga čimbenika rasta (EGFR).

Mnogo je tvrdnji o dobrobiti matične mlijeci za ljudsku zajednicu, uključujući kvalitetniji život i liječenje lakših bolesti. Spektar djelovanja matične mlijeci na organizam je višestruk te ga danas medicina prihvata kao stimulativno i regenerativno sredstvo. Unatoč tome, mnoge od tih tvrdnji trebalo bi svakako detaljnije klinički istražiti i znanstveno dokazati.

Kemijski sastav matične mlijeci

Matičnu mlijec čine voda (60 do 70) %; proteini (10 do 18) % (albumini, α , β , γ globulini, glikoproteini,

lipoproteini, 23 aminokiseline); šećeri (9 do 15) % (glukoza, fruktoza, neznatne količine riboze, maltoze, izomaltoze, gentiobloze, turanoze, trehaloze, neotrehaloze); lipidi (1,5 do 7) % (fenoli, steroli i gliceroli, vosak, neutralne masti, fosfolipidi, slobodne organske kiseline); anorganske tvari (0,7 do 1,5) % (K, Na, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, Si, Cr, Ni, Ag, Co, Al, As, Hg, Bi, Au, S, P); vitamini (336 do 351) mg g⁻¹ (B₁, B₂, B₃, B₅, B₆, B₇, B₉, B₁₂, pantotenska kiselina, biotin, folna kiselina, inozitol, vitamin E, D, A, K, C) (3-5).

U mlijeci se nalaze još i različiti enzimi (amilaza, invertaza, katalaza, kisela fosfataza i dr.), neuroprijenosnici (acetilkolin i kolin) i spolni hormoni (estradiol, testosteron, progesteron). Farmakološki učinci matične mlijeci pripisuju se *trans*-10-hidroksi-2-decenskoj kiselini, 10- hidroksidecenskoj kiselini, rojalizinu, apisinu i nekim antimikrobnim proteinima (6, 7). Osnovni sastav matične mlijeci prikazan je u tablici 1.

Proteini matične mlijeci čine oko polovine suhe tvari i uglavnom su topivi u vodi. Više od 80 % topivih proteina, tzv. glavni proteini matične mlijeci (MRJPs, engl. *major royal jelly proteins*) (8, 9), glavni su čimbenici odgovorni za specifičnu fiziološku ulogu matične mlijeci u razvoju matice. Oni uključuju brojne esencijalne aminokiseline, slične ovalbuminu i kazeinu (8). U ranijim izvješćima, obitelj MRJP čini većinu topljivih proteina (31 %), ima devet članova; MRJPs 1-9 (10-12). MRJP 1 slabo je kiseli glikoprotein (pH 4,9 do 6,3; 55 kDa) koji tvori oligomere od 350 kDa ili 420 kDa (13, 14). MRJP 2, MRJP 3, 4 i MRJP 5 su glikoproteini od 49 kDa, 60 kDa do 70 kDa, 60 kDa i 80 kDa (8, 15). Fiziološka funkcija proteina matične mlijeci opisana je u mnogobrojnim radovima (16-22). Neki od MRJPs stimuliraju proliferaciju stanica (17-21), a neki pak inhibiraju bisfenolom A-induciranu proliferaciju ljudskih staničnih linija raka dojke (22). Osim toga, MRJP 1 i 2 stimuliraju makrofage miša oslobođanjem TNF- α (9), a MRJP 3 modulira imunosni odgovor potiskivanjem proizvodnje IL-4, IL-2 i IFN- γ u T-limfocitima (23, 24).

Sveukupno je u matičnoj mlijeci uporabom jednodimenzionalne gel elektroforeze otkriveno 37, a drugim analizama 22 neredundantna proteina, a 19 novih proteina nađeno je proteomičkim pristupom (15, 16). Glavne proteinske komponente matične mlijeci su MRJPs i proteini vezani uz metabolizam ugljikohidrata, kao što su glukoza oksidaza, prethodnik-glukozidaza i glukoza dehidrogenaza. Tih 19 novootkrivenih proteina uglavnom je svrstano u tri

funkcionalne kategorije: oksido-redukcijски proteini, protein vezujući proteini i lipid prijenosni proteini.

Danas se matična mlijec intezivno istražuje, posebice u Japanu, te su mnoge pretpostavke njene učinkovitosti i znanstveno potvrđene. Osim što se rabi kao kozmetički i prehrambeno-dijetni dodatak, vjeruje se da ima i biostimulativni te regenerativni učinak na ljudsko zdravlje. Spektar korisnoga djelovanja matične mlijeci na oporavak organizma te prevencija mnogih nefizioloških stanja pod njenim utjecajem temelji se na iznimnom kemijskom sastavu. Ipak, unatoč brojnim istraživanjima još nema dovoljno podataka o učinkovitosti matične mlijeci u poboljšanju ljudskoga zdravlja. Biološki učinak matične mlijeci istraživan je uglavnom na životinjskim pokusnim modelima i staničnim kulturama, a manje na ljudima. S obzirom na kompleksnost matične mlijeci, u novijim se istraživanjima provodi pročišćivanje i proučavanje biološke učinkovitosti pojedinih bioaktivnih molekula koje ona sadrži.

S obzirom na izvanredne biološke značajke i njenu uporabu u mnogim sektorima, od farmaceutske i prehrambene industrije te proizvodnje kozmetičkih pripravaka, postoji potreba za standardizacijom matične mlijeci te istraživanjem njenih kvalitativnih i kvantitativnih vrijednosti kroz vrednovanje različitih komponenti i provedbu analitičkih ispitivanja bioloških aktivnih sastavnica te njihovih promjena tijekom skladištenja i čuvanja.

Matična mlijec, ljepota i odgoda starenja

Salazar-Olivio i Paz-Gonzales (25) pokazali su da proteini matične mlijeci mogu imati učinak u odgodi i sprječavanju starenja. Starenje je višezačan proces na koji utječu brojni čimbenici; posebice se temelji na smanjenju stanične proliferacije i obnove tkiva te postupnoga gubljenja funkcije. Ti su autori pokazali da matična mlijec ima mitogeni učinak (potiče proliferaciju) na stanice kukaca u kulturi. Watanabe i sur. (21) mitogeni su učinak matične mlijeci pokazali na stanicama U-937 (stanična linija ljudskih monocita) a pojačanu sintezu DNA i albumina u stanicama jetara potvrdili su Kamakura i sur. (17). Smatra se da matična mlijec sadrži čimbenike rasta ili hormone koji pospješuju stanični rast. Ti podatci potvrđuju kozmetičku učinkovitost matične mlijeci zajedno s podatcima da pojedine proteinske sastavnice matične mlijeci pojačavaju sintezu novih adhezijskih molekula na površini stanice. Drugi autori (26) pokazuju da matična mlijec može povećati životni vijek miševa C3H/HeJ kroz mehanizam koji se temelji na redukciji

oksidativnih oštećenja. Već je odavno poznata teorija "slobodnih radikala i starenja"; reaktivni kisikovi radikali (ROS) nastali u stanicama rezultiraju skupnim oštećenjem stanice (27). Točnije, poremećaj ravnoteže između ROS proizvodnje i antioksidativne obrane određuje stupanj oksidativnoga stresa. Posljedice stresa uključuje promjene staničnih proteina, lipida i DNA. Rezultati brojnih istraživanja pokazali su da je starenje stanica i organizma posljedica nakupljanja povećane razine oksidativnih oštećenja jezgrine DNA; endogena oštećenja DNA uzrok su starenja i degenerativnih bolesti povezani sa starošću, primjerice tumora, srčanih bolesti i bolesti krvožilnoga sustava. Mutacije kao posljedica oksidativnih oštećenja skraćuju životni vijek. Iako je matična mlijec povećala preživljenje miševa za 50 %, autori smatraju da se mehanizam ne temelji na sakupljanju slobodnih radikala nego na obuzdavanju oksidativnoga oštećenja tkiva, moguće kroz ublaženje uvjeta kronične upale.

Koya-Miyata i sur. (28) pokazali su da matična mlijec ima učinak na proizvodnju kolagena u fibroblastima kože te su izdvojili aktivnu sastavnicu pod nazivom čimbenik proizvodnje i promicanja kolagena. Kolagen je predominantni vlaknasti protein izvanstaničnoga matriksa i glavni protein vezivnoga tkiva u ljudskom tijelu. Oko 3 % do 6 % cijelokupnih proteina u tijelu čini kolagen, i funkcionalna svojstva kože ovise o cijelovitosti kolagena u dermi. Promjene u stupnju taloženja kolagena javljaju se tijekom zacjeljivanja rana, razvoja kosti i sa starenjem. Kontrola metabolizma kolagena posebice je važna u terapeutskoj i kozmetičkoj primjeni. Koya-Miyata i sur. (28) potvrdili su da su 10-hidroksi-2-decenska kiselina i 10-hidroksidecenska kiselina farmakološki aktivne sastavnice matične mlijeci u proizvodnji kolagena. Te kiseline u prisutnosti askorbinske kiseline potiču stvaranje transformirajućega čimbenika rasta koji povećava proizvodnju kolagena, ovisno o dozi. Ostaje još nejasno utječu li te kiseline i na enzime ključne u sintezi kolagena (prolil hidroksilazu i lisil hidroksilazu). Danas se matična mlijec koristi u različitim preparatima. Njen se učinak temelji na ubrzaju oksidativnoga metabolizma te kataboličkih i anaboličkih reakcija izmjene tvari.

Matična mlijec i njena učinkovitost na moždane stanice

U svijetu, posebice u zapadnim zemljama danas bilježimo stalno povećanje broja starijih ljudi koje prati pad spoznajnih mogućnosti ljudi i porast neuropsihijatrijskih poremećaja poput Alzheimerove

bolesti i depresije – dominantnih problema u starijoj populaciji. Rezultati nedavnih istraživanja sugeriraju da su neurotropni čimbenici uključeni u etiologiju i/ili razvoj tih bolesti i da pojačana sinteza neuropeptidnih čimbenika može biti obećavajući čimbenik u zaštiti od ovih bolesti. Hashimoto i sur. (29) otkrivaju da matična mlijec selektivno potiče ekspresiju mRNA neutrofickog čimbenika glija stanica (engl. *glial cell line-derived neurotrophic factor*; GDNF), koji djeluje na mozak i na filament H, dominantni biljeg aksona u hipokampusu odraslih miševa. Utvrđeno je da dodatak egzogenoga GDNF čimbenika ima prije svega zaštitnu ulogu u borbi protiv smrtri dopaminergični neurona, ishemičnih i traumatskih moždanih oštećenja. Ta opažanja sugeriraju da endogeni GDNF ima sličnu zaštitnu ulogu u borbi protiv neuroloških poremećaja kojih je danas sve više zbog starije populacije ljudi. Nedvojbeno je da su ta opažanja za GDNF obećavajući put prema zaštiti ili obradi neuroloških bolesti, posebice zato što će otkrivanje aktivnih sastavnica koje reguliraju ekspresiju i evoluciju učinka matične mlijeci na moždane funkcije, kao što su učenje i pamćenje, pridonijeti boljom primjeni matične mlijeci u brizi za zdravlje i ili u kliničkoj uporabi u liječenju neuroloških poremećaja. Hattori i sur. (30, 31) potvrđuju učinak matične mlijeci i njene jedinstvene masne kiseline, 10-hidroksi-2-decenske kiseline, na neurogenезu neuralnih progenitorskih matičnih stanica *in vitro*. Matična mlijec olakšava diferencijaciju svih tipova moždanih stanica (neurona, astrocita i oligodendrocita). Uz to, 10-hidroksi-2-decenska kiselina povećava proizvodnju neurona a smanjuje proizvodnju astrocita. Neuralnim matičnim stanicama/progenitorskim stanicama (NSCs) svojstveno je samoobnavljanje i mnogostruka aktivnost da se diferenciraju u neurone, astrocite i oligodendrocite. Oštećeni mozak ima mogućnost popravka preko aktiviranih NSCs-a. NSCs su cilj za liječenje Alzheimerove i ili Parkinsonove bolesti. Razumijevanje biološke učinkovitosti matične mlijeci na molekularnoj razini zasigurno će pridonijeti učinkovitoj zaštiti moždanih stanica i terapiji nekih neuroloških bolesti.

Matična mlijec i šećerna bolest

Matična mlijec sadrži sastavnice funkcionalno i strukturno slične inzulinu (32). Potvrđeno je da matična mlijec može potaknuti usmjeravanje preadipocita u adipocite. Proces adipogeneze prije je posljedica adipogenih signala sadržanih u matičnoj mlijeci nego njene inzulinske aktivnosti. Prema Erski-

Biljić (33) matična mlijec zauzima jedno od prvih mjesto na popisu terapeutskih pripravaka s regenerativnim značajkama: uočeno je da potiče regeneriranje oštećenih stanica gušterice, sprječavajući nastanak dijabetesa. Regeneracija stanica gušterice i očuvanje razine inzulina ključni su čimbenici za pad razine šećera u krvi (33). Nomura i sur. (34) potvrdili su na štakorskem modelu za tip 2 dijabetesa OLETF (engl. *Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty*; OLETF) da bi dugotrajna primjena matične mlijeci mogla biti učinkovita i funkcionalna hrana u sprječavanju razvoja inzulinske otpornosti (rezistencije).

Protutumorska učinkovitost matične mlijeci i stimulacija hematopoieze

Protutumorski učinak matične mlijeci pripisuje se njenoj aktivnoj sastavni 10-hidroksi-decenskoj kiselini te zasićenim dikarboksilnim kiselinama (sukcinska, glutarna, adipinska, pimelinska, suberinska, azelainska, sebacinska kiselina). Učinak matične mlijeci za sada je istražen na 6C₃HED limfosarkomu, TA₃ mamarnom karcinomu, ascitičnom Erlichovu karcinomu, leukemiji AKR miša, sarkomu 180, Erlichovu solidnom tumoru te na L1210 i P388 limfatičkoj leukemiji (35-38). Matična mlijec pokazala se učinkovitom u spororastućim tumorima, ali ne i u brzorastućima. Rezultati istraživanja što su ga proveli Oršolić i sur. (39-41) pokazuju da matična mlijec smanjuje broj tumorskih čvorića samo ako se daje istovremeno s tumorskim stanicama te da ima značajna imunomodulatorna svojstva (42). Matična mlijec potiče formiranje limfocita T odgovornih za imunosni odgovor protiv virusa i tumorskih stanica (43). Protutumorska učinkovitost matične mlijeci pokazana je i na stanicama HeLa (karcinom vrata maternice), posebice izolirani proteinski odjeljak RJP₃₀ s 50 % citotoksičnošću.

Stanice Erlichova ascitičnog tumora (EAT) rastu brzo u većini sojeva miševa uzrokujući izrazito narušavanje hematopoetske i imunosne funkcije. Narušavanje hematopoetske i imunosne funkcije uzrok je smrti domaćina čak i uz prisutnost malog broja tumorskih stanica. Erlichov ascitični tumor uzrokuje oštećenja u broju granulocitno-makrofagnih kolonija u slezeni i potiče stvaranje prirodnih supresorskih stanica. Fagociti, posebice makrofagi i neutrofili, imaju važnu ulogu u urođenoj i stičenoj imunosti odnosno u obrani domaćina protiv različitih infektivnih tvari i rasta tumora. Najvažnija značajka ovih stanic, potrebitih u imunosnoj reakciji posredovanoj stanicama i nespecifičnoj upalnoj

reakciji, njihova je sposobnost da migriraju unutar upalnog područja. Istraživanja temeljena na životinjskim modelima pokazala su da tumorske stanice mogu proizvoditi čimbenike koji oštećuju upalni odgovor, omogućavajući rast tumora *in vivo*. Točnije, tumorske stanice mogu stimulirati supresornu aktivnost makrofaga u domaćinu. Osim nedostatne akumulacije fagocita u upalno mjesto, neke druge stanične odrednice promijenjene su u nositelja tumora, posebice odgovor granulocitno-makrofagnih kolonija na čimbenik aktivacije kolonija. Zanimljivo je da se obradom zdravih miševa matičnom mlijecu nije povećao ni broj stanica koštane srži ni broj granulocitno-makrofagnih kolonija u slezeni kod primjene doze od $0,5 \text{ g kg}^{-1}$; $1,0 \text{ g kg}^{-1}$; i $1,5 \text{ g kg}^{-1}$, a u miševa koji su nositelji EAT-a u preventivnoj obradi povećan je broj stanica koštane srži te broj klasičnih aktiviranih makrofaga (M1) u perifernoj krvi. Povećanje broja dugoživućih matičnih stanica u kulturi te veći broj granulocitno-makrofagnih kolonija opaženi su nakon obrade kulture stanica s matičnom mlijecu, koja potiče oporavak makrofaga te povećava njihov broj i aktivnost. Oporavak hematološkoga poremećaja u miševa koji su nositelji EAT-a povezan je i s njihovim dužim preživljenjem. Pokazano je da makrofagi pridruženi tumoru (M2, alternativni makrofagi koji nastaju polarizacijom makrofaga tijekom upale) potiču i stimuliraju rast tumora te inhibiraju aktivnost NK stanica i T limfocita (44, 45). Očito neke od sastavnica matične mlijecu sprječavaju supresorni učinak samog tumora na makrofage te pojačavaju imunomodulatornu aktivnost samih makrofaga koji postaju učinkovitiji u kontroli rasta i širenja tumorskih stanica. Matična mlijec štiti i od imunosupresije makrofaga prouzročene tvarima koje luče tumorske stanice; posebice se njen značaj očituje u inhibiciji razine prostaglandina (PGE_2), čimbenika koji inhibira tumoricidalnu aktivnost makrofaga. PGE_2 mijenja imunosni odgovor uključujući mitogenezu limfocita T, proizvodnju citokina te makrofagima i NK stanicama posredovanu citotoksičnost na tumorske stanice. Uz to, matična mlijec može inhibirati neke proupalne citokine, primjerice $\text{TNF}-\alpha$, $\text{IL}-6$, i $\text{IL}-1$ bez smanjenja citotoksičnoga učinka makrofaga stimuliranih s LPS i ili LPS + IFN- γ (44). Tako Bincoletto i sur. (45) smatraju da je smanjenje razine PGE_2 u miševa koji su nositelji EAT-a, obrađenima matičnom mlijecu, glavni uzrok povećanju njihova preživljenja. Razvidno je da matična mlijec kao modifikator biološkog odgovora smanjuje mijelosupresiju i povećava antitumorsku učinkovitost. Rezultati naših istraživanja

potvrđuju tu činjenicu na štakorima kao pokusnim modelima (41, 42). Inhibicija sinteze prostaglandina uporabom matične mlijecu ($2,5 \text{ mg mL}^{-1}$) u makrofagima stimuliranim LPS + IFN- γ bila je manja za 63 % u usporedbi s kontrolnom skupinom makrofaga. Takav rezultat daje nadu i mogućnost učinkovite primjene matične mlijecu kao dodatka prehrani u cilju poboljšanja kvalitete života ljudi s autoimunim bolestima, poput reumatoидног artritsa i upalnih crijevnih bolesti. Sastavnica matične mlijecu koja stimulira proliferaciju ljudskih monocita nedavno je izolirana i okarakterizirana kao glikoprotein mase 350 kDa (apisin). Osim toga, zaštitni učinak matične mlijecu na hematopoiezumu potvrđen je u miševa ozračenih X-zrakama (46-48), gdje matična mlijec sprječava zračenjem prouzročena oštećenja matičnih stanica. Imunostimulativna svojstva matične mlijecu združene s propolisom (pripravak nazvan Apinalin) na proces granulocitopoeze i limfopoeze zapažena su nakon zračenja miševa dozom od 3 Gy i ili 5 Gy. Brza obnova stanica bila je razvidna već nakon deset dana u usporedbi s kontrolnom skupinom miševa (49). Nakaya i sur. (22) pokazali su aktivnost matične mlijec na okolišni estrogen utvrditi da ona inhibira bisfenolom A-induciranu proliferaciju ljudskih staničnih linija raka dojke (MCF-7). Bisfenol A dobro je poznat okolišni estrogen; kemijski spoj s dvjema funkcionalnim skupinama fenola koji se uglavnom koristi za proizvodnju polikarbonatne plastike i poliepoksida. Bisfenol A uzrokuje poremećaje endokrinoga sustava oponašajući prirodne tjelesne hormone, čime može negativno utjecati na zdravlje, posebice žena (50, 51). Nadalje, matična mlijec može modulirati razinu oksidativnoga stresa i apoptozu u stanicama jetara i bubrega štakora obrađenih kemoterapeutikom cisplatinom. Profilaktički unos matične mlijecu značajno smanjuje razinu malondialdehida (MDA) prouzročenog izlaganjem cisplatini u jetrima i bubregu. Antioksidativna sposobnost matične mlijecu usko je povezana s njenim slobodnim aminokiselinama, kao što su aspartatna kiselina, L-cistein, cistin, tirozin, glicin, lizin, leucin, izoleucin i valin (52). Pozitivni učinak matične mlijec na antioksidacijski sustav vidljiv je i u povećanju razine glutationa (GSH), glutation peroksidaza (GSH-Px), aktivnosti glutation-S-transferaza (GST) i superoksid dismutaza (SOD). Matična mlijec može smanjiti toksičnost inducirane tetraklorometanom, kadmijem i paracetamolom na jetrene stanice te ublažiti njihovu genotoksičnost i nefrotoksičnost (53-55). Zbog svoje visoke kemijske reaktivnosti, reaktivni

radikali kisika (ROS) nastali tijekom toksičnoga djelovanja tih spojeva uzrok su peroksidacije lipid-a i oksidacije DNA i proteina. Matična mlijec inhibira lipidnu peroksidaciju, sprječava gubitak fluidnosti bioloških membrana, promjene membranskoga potencijala i permeabilnosti prema H^+ i drugim ionima, te tako održava cjelovitost stanica.

Antialergijski učinak matične mlijec

Na modelu miša potvrđen je i antialergijski učinak matične mlijec (24). Ta se značajka pripisuje glikoproteinu mase 75 kDa, nazvanom glavni protein MM 3 (engl. *major royal jelly protein 3*; MRJP3) koji inhibira proizvodnju IL-4 u stimuliranim stanicama slezene miševa imuniziranih ovalbuminom. MRJP3 inhibira ne samo IL-4, koji je ključan u prekapčanju teškog lanca IgE, te IL-2 i IFN- γ odveden od stanica T nego i proliferaciju stanica T. Snažni imunoregulatorni učinak tog proteina, posebice u inhibiciji razine IgE i IgG1 imuniziranih miševa, mogao bi biti od kliničkog značaja u dizajniranju antialergičnih peptida. Oka i sur. (56) smatraju da je supresija alergijske reakcije s matičnom mlijec udružena s očuvanjem funkcije makrofaga i poboljšanjem Th1/Th2 odgovora. Ti su autori na DNP-KLH (engl. 2, 4-dinitrophenylated keyhole limpet hemocyanin) imuniziranom mišu potvrdili da matična mlijec čuva razinu GSH u makrofagima i povećava proizvodnju IL-12 i NO, a smanjuje proizvodnju prostaglandina E2 u makrofagnim stanicama. Zaključili su da matična mlijec suprimira antigen specifičnu proizvodnju IgE i oslobođanje histamina iz mastocita, čuva funkciju makrofaga te poboljšava Th1/Th2 stanični odgovor u DNP-KLH miševa. Povećanje razine GSH pomoću matične mlijec u makrofagima ključno je za povećanje IL-12 te usmjeravanje Th1 odgovora, a tome pogoduje i smanjenje razine prostaglandina E2; povećanje razine prostaglandina E2 suprimira Th1 odgovor i povećava razinu IgE. Nadalje, degranulacija mastocita smanjena je povećanjem razine NO iz makrofaga. Sve navedene odrednice pokazatelj su da matična mlijec može zaštiti od alergije ili ublažiti alergijske simptome te da inhibira razvoj kožnih lezija sličnih atopijskom dermatitisu (57).

Estrogenski učinak matične mlijec

Mishima i sur. (19) pokazali su da matična mlijec ima slab estrogenski učinak zbog kompeticije s 17β estradiolom za vezno mjesto na α i β estrogenski receptor ljudi. Obrada MCF-7 stanica s matičnom

mlijec pojačava njihovu proliferaciju, a prateća obrada s $1 \mu\text{mol L}^{-1}$ tamoksifena (kemoterapeutik antagonist estrogenskoga receptora) taj učinak dokida. Nadalje, potkožna injekcija matične mlijec ponovo uspostavlja ekspresiju gena za krvožilni endotelijalni čimbenik rasta u ovarioktomiziranih miševa. Budući da estrogen ima ključnu ulogu u metabolizmu kosti, posebice u žena, nedostatak istoga glavni je čimbenik gubljenja koštane mase i razvoja osteoporoze u postmenopauzi. Uporaba fitoestrogena u prehrani značajna je opcija u sprječavanju osteoporeze. U *in vitro* istraživanjima uporabom mišje osteoblastične linije MC3T3-E1 pokazano je da genistein i daidzein povećavaju aktivnost alkalne fosfataze i pojačavaju mineralizaciju, vjerojatno kroz njihov estrogenski potencijal. Obrada stanica MC3T3-E1 s matičnom mlijec stimulira njihovu proliferaciju, proizvodnju kolagena tipa I i druge aktivnosti za formiranje kosti, djelujući na osteoblaste. Oralna primjena matične mlijec kod miševa tijekom devet tjedana povećala je težinu i sadržaj kosti tibije te prouzročila značajne promjene u ekspresiji gena koji se odnose na formiranje izvanstaničnog matriksa. Ista učinkovitost matične mlijec pokazala se i na štakorskome modelu, što potvrđuje da kao dodatak prehrani može biti nova alternativa u prevenciji osteoporoze (20, 58).

Husein i Kridli (59) te Huseini i Haddad (60) potvrdili su učinak matične mlijec na reproduktivnu sposobnost ovaca. Združena s progesteronom, matična mlijec može poboljšati reproduktivni odgovor u ovaca ubrzavanjem ovulacije, a utvrđen je i povećan rast folikula te lučenje estradiola.

Antimikrobna aktivnost

Upravo zbog niza problema vezanih za otpornost (rezistenciju) mikroorganizama na antibiotike koji su danas u uporabi, javlja se potreba za istraživanjem nove klase antibiotika s mehanizmima djelovanja na koje se ne bi razvila otpornost. U ovom su desetljeću pljesni i bakterije bili izvorište novih antibiotika, a kukci su tek nedavno postali zanimljivi istraživačima. Naime, oni nemaju limfocitni imunosni sustav, ali mogu uspješno odstraniti bakterije (61) i čak steći prijenosnu imunost, što upućuje na postojanje vrlo snažnih antimikrobnih tvari u kukcima. Osim kutikule kao fizičke zapreke, kukci imaju urođeni humoralni i stanični obrambeni sustav, temeljen na tkivima i hemocitima. Masno tkivo i stanice kukaca stvaraju brojne antimikrobne peptide, koji su sadržani u njihovoj hemolimfi. Ti peptidi djeluju na bakterije kroz nekoliko mehanizama: i) stvaraju peptidne monomere

koji se udružuju i formiraju velike transmembranske kanale na bakterijskoj stijenci, ii) peptidi koji djeluju poput detergenta i razaraju bakterijsku staničnu stijenku. Peptidi se mogu svrstati prema spektru djelovanja u tri skupine: i) peptide aktivne protiv bakterija, ali ne protiv normalnih stanica sisavaca i gljiva (selektivni peptidi), ii) peptide aktivne protiv bakterija, ali i protiv normalnih stanica sisavaca, potencijalno aktivne i protiv gljiva, iii) peptide aktivne isključivo protiv gljiva, ali ne protiv bakterija i normalnih stanica sisavaca (62). Antibakterijska aktivnost pripisuje se proteinu mase 5,5 kDa rojalizinu i *trans*-10-hidroksi-2-decenskoj kiselini, koji imaju učinak na gram-pozitivne i gram-negativne bakterijske vrste (63, 64). Te dvije antibakterijske sastavnice odgovorne su i za same pčele. Fontana i sur. (6) izolirali su iz matične mlječe četiri antibakterijska peptida (engl. *Jelleine-I-IV*) uporabom obrnuto-faznog HPLC-a. U usporedbi s *Jelleine-IV*, *Jelleine-I-III* pokazuju isključivo antimikrobno svojstvo protiv kvasca, gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterijskih vrsta. Navedeni antimikrobnii peptidi (*Jelleine I-IV*) ne pokazuju sličnost s drugim antimikrobnim peptidima, poput himenoptaecina, apidaecina, abaescina i rojalizina. Matična mlječe ubija praživotinju vrste *Trypanosoma cruzi*, njeno je djelovanje potvrđeno i kod dizenterične amebe te na virus gripe. Višekratno davanje malih doza matične mlječe povećava otpornost na stres u pokusnih životinja, a velike doze djeluju letalno. Dokazana su i antibakterijska i baktericidna svojstva (na vrste *Bacillus alvei*, *Streptococcus haemolyticus B*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus vulgaris*, *Micrococcus*, *Listeria monocytogenes*). Baktericidno djelovanje izraženije je kod gram pozitivnih mikroorganizama, a učinak je malo slabiji kod gram negativnih mikroorganizama, i može se okarakterizirati kao bakteriostatski (*Escherichia coli*). Antibakterijska učinkovitost pripisuje se slobodnim masnim kiselinama (65).

Učinkovitost matične mlječe u snižavanju krvnog tlaka i zaštiti krvožilnog sustava i srca

Antihipertenzivnu osobitost matične mlječe *in vitro* istražili su Okuda i sur. (66) te su utvrdili da su *trans*-2-oktenoična kiselina i *trans*-10-hidroksi-2-decenska kiselina uključene u kontrolu krvnog tlaka. U uvjetima *in vivo* taj je hipotenzivni učinak nezasićenih masnih kiselina upitan zbog njihove nestabilnosti u probavnom sustavu. Matsui i sur. (67) objasnili su fiziološku funkciju matične mlječe na spontano hipertenzivnim štakorima. Matična mlječe

sadrži proteine koji su dobro izvorište inhibitora angiotenzin-I-konvertirajućih peptida (engl. *angiotensin I-converting enzyme*; ACE), a nastaju enzimskom hidrolizom u probavnom sustavu. Krvni tlak u organizmu regulira renin-angiotenzinski sustav, koji ima važnu fiziološku ulogu u cirkulaciji i ili lokalnim organima. ACE inhibitorni peptidi, primjerice IY, VY i IVY u proteazama obrađenoj matičnoj mlječe otporni su na želučano-crijevne proteaze. Ti peptidi u krvnim žilama mogu regulirati lučenje drugih aktivnih tvari na tlak, primjerice NO-a, endotelina ili prostaglandina. Isti antihipertenzivni učinak peptida matične mlječe pokazali su i Tokunaga i sur. (68) na spontano hipertenzivnim štakorima, što potvrđuje da matična mlječe može biti funkcionalna hrana u poboljšanju krvnog tlaka ljudi s povиšenim krvnim tlakom (hipertenzijom). Prema autorima (69-71) primjena hidrolizirane matične mlječe smanjuje visoku razinu kolesterola i povećava razinu hemoglobina u ljudi te poboljšava homeostazu organizma.

Primjena matične mlječe dovodi do sniženja razine kolesterola u pokusnih životinja i ateroskleroze u ljudi (69-71). Značajno je djelovala na metabolizam lipida u štakora i sprječila aterosklerozu u zeca koji je bio hranjen namirnicama bogatima kolesterolom. Povrh toga, oralna ili injekcijska primjena matične mlječe značajno snižava razinu serumskih lipida i kolesterola u aterosklerotskim pacijenata s umjerenom visokom razinom kolesterola. Istražujući učinak matične mlječe na serumске lipide kod ljudi, Vitek (72) je pokazao da ona snižava ukupne lipide (oko 10 %) u serumu i jetrima, ali i razinu kolesterola (za 14 %) ako se primjenjuje redovito u dozi od 5 mg do 100 mg na dan najmanje 2-3 mjeseca. Visoka razina kolesterola u krvi rizični je čimbenik za bolesti srca i krvožilnog sustava kao što su aterosklerozu, visoki tlak, srčani udar, angina pektoris i druge srčane i krvožilne tegobe, čak za moždani udar i dijabetes.

Glavni lipidi plazme uključuju kolestrol, trigliceride i fosfolipide. Lipoproteini su makromolekularni kompleksi koji imaju važnu ulogu u prijenosu i metabolizmu lipida. Lipoprotein male gustoće (LDL, engl. *Low Density Lipoproteins*) glavni je prijenosnik kolesterola u krvotoku. Visoka razina kolesterola u serumu najčešće se odnosi na prekomjerno visoku razinu LDL kolesterola. Visoki LDL može biti posljedica njegova prevelikog stvaranja uslijed nedostatnog uklanjanja lipoproteina vrlo male gustoće (VLDL, engl. *Very Low Density Lipoproteins*), prekursora LDL-a putem jetara. LDL je proizvod

nastao cijepanjem VLDL-a (veliki, srednji i mali VLDL). U plazmi su velike VLDL čestice eliminirane kao takve ili katabolizirane do malih VLDL kroz lipolizu triglicerida pomoću lipaza lipoproteina vezanih za endotel. Metabolizam VLDL pojavljuje se kao jedan od regulirajućih čimbenika koncentracije LDL kolesterola. Nadalje, VLDL vodi povećanju LDL-a, za koji je dokazano da ima aterogene značajke.

Guo i sur. (71) upućuju na to da unos matične mlijeci kao dodatka prehrani smanjuje ukupnu razinu kolesterola i LDL-a, smanjenjem razine malog VLDL-a. Nedavno je sugerirano da je mali VLDL snažni neovisni prediktor progresije bolesti i više izravno uključen u progresiju ateroskleroze od LDL-a, koji se tradicionalno smatra glavnim aterogenim lipoproteinom.

Znanstvene tvrdnje o učinkovitosti matične mlijeci na zdravlje ljudi prema PASSCLAIM-klasifikaciji

Glavna je svrha PASSCLAIM-projekta (engl. *Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Foods*) definirati skup općeprimjenjivih kriterija za znanstveno obrazloženje zdravstvenih tvrdnji o učinkovitosti hrane. Ti se kriteriji smatraju znanstveno snažnim pokazateljima za procjenu kvalitete podataka dostavljenih u prilog tvrdnji o učinku hrane na zdravlje. Prema Uredbi Europske unije (EU) EC 1924/2006, za učinak matične mlijeci mogu biti izvedene različite zdravstvene tvrdnje. Tvrđne su svrstane prema PASSCLAIM-klasifikaciji (International Life Science Institute, ILSI) u sljedeća tematska područja:

1. Prehrana i kardiovaskularne bolesti
2. Zdravlje kostiju i osteoporozu
3. Fizička snaga i kondicija
4. Regulacija tjelesne težine, osjetljivost na inzulin i rizik od dijabetesa
5. Prehrana i rak
6. Mentalno stanje i učinkovitost
7. Zdravlje crijeva, probava i imunost

U skladu s podatcima iznesenima u ovom preglednom članku, mogu se izvesti sljedeće zdravstvene tvrdnje:

1. Prehrana i kardiovaskularne bolesti
Redovitom primjenom matične mlijeci preventivno u dozi od 100 mg do 200 mg na dan može se poboljšati zdravlje kardiovaskularnog sustava, s obzirom na smanjenje kardiovaskularnih čimbenika rizika, masnoće i kolesterola u krvi. Prema autorima (5, 72, 75) nakon 30 dana primjene matične mlijeci treba napraviti stanku od 2 do 3 tjedna te započeti primjenu s nižim dozama.
2. Fizička snaga i kondicija
Uzimanjem matične mlijeci može se poboljšati fizička snagu, kondicija i radna sposobnost, pogotovo u starijih osoba (engl. *anti-age effect*).
3. Prehrana i rak
Uzimanjem matične mlijeci može se smanjiti rizik od raka.
4. Mentalno stanje i učinkovitost
Uzimanjem matične mlijeci može se poboljšati mentalno stanje i fizička učinkovitost. Ti su učinci posebno značajni u starijih ljudi (engl. *anti-age effect*).

Tablica 1 Sastav svježe i liofilizirane matične mlijeci

Sastav	Svježa matična mlijec	Liofilizirana matična mlijec
Voda / %	60 do 70	<5
Lipidi / %	3 do 8	8 do 19
10-hidroksi-2-decenska kiselina (10-HDA) / %	>1,4	>3,5
Proteini / %	9 do 18	27 do 41
Fruktoza + glukoza+ sukroza / %	7 do 18	-
Fruktoza / %	3 do 13	-
Glukoza / %	4 do 8	-
Sukroza / %	0,5 do 2,0	-
Pepeo (suha tvar) / %	0,8 do 3,0	2 do 5
pH	3,4 do 4,5	3,4 do 4,5
Kiselost / 0,1mol L ⁻¹ NaOH (mL g ⁻¹)	3,0 do 6,0	-
Furozin / mg u100 g proteina	<50	-

Neki od navedenih bioloških učinaka vidljivi su u tablici 2 i tablici 3.

Potreba standardizacije važnih biološki aktivnih sastavnica, utvrđivanja valjanosti i kakvoće pripravaka s matičnom mlijecu

Iako se matična mlijec primjenjuje od davnina, preporuka za njenu primjenu u humanoj terapiji datira od 1922. u Francuskoj, kada postaje predmet brojnih istraživanja. Primjena matične mlijec u medicini u mnogim zemljama diljem svijeta pod stalnom je kontrolom ministarstava zdravlja. U cilju sigurne primjene matične mlijec kao ljekovitoga pripravka, važno je sačuvati sastavnice odgovorne za blagotvoran učinak na zdravlje stalmom analizom kemijskoga sastava matične mlijec i kakvoće te osigurati sigurnu proizvodnju.

Od kraja 19. stoljeća do danas provedena su brojna istraživanja matične mlijec (98-100). Međutim, teško je spojiti podatke prikupljene od različitih autora zbog nedostatka homogenosti među uporabljenim materijalima, od različitih postupaka uzorkovanja i proizvodnih uvjeta. U dodatne čimbenike koji pridonose nehomogenosti podataka svrstavaju se i brojni eksperimentalni uvjeti, raznolikost analitičkih metoda te potreba za njihovom kontinuiranom provedbom.

Neophodno je poznavanje sastava matične mlijec kako bi se definirao standardni sastav, procijenila kakvoća komercijalnih proizvoda i otkrila prisutnost matične mlijec u drugim proizvodima koji je sadrže. Neke zemlje, poput Švicarske (100), Bugarske, Brazila i Urugvaja, definirale su nacionalne standarde za matičnu mlijec. Naime, postoje razlike u kakvoći matične mlijec, posebice sezonske i geografske, a neki smatraju da su neke promjene ovisne o vrsti pčela koje ih proizvode. Također, jasno treba navesti razlike između sveže matične mlijec i liofiliziranih uzoraka. Ukupni analitički podaci potvrdili su ne samo da izloženost temperaturi od 4 °C ne uzrokuje promjene u sastavu matične mlijec nego da njeno skladištenje u zamrznutom stanju sprečava razgradnju biološki aktivnih proteina, što upućuje na to da matičnu mlijec treba zamrznuti neposredno nakon skupljanja zbog očuvanja biološki aktivnih sastavnica (101). Prilično složen sastav matične mlijec čine različite bjelančevine, aminokiseline, organske kiseline, steroidi, esteri, fenoli, šećeri, minerali, elementi u tragovima i drugi sastojci (vidi gore navedene sastavnice sveže matične mlijec). Osim toga, njen sastav varira prema sezonskim i regionalnim uvjetima, a liofilizirani proizvod zbog

visokog postotka vode sadrži <5 % vode, (27 do 41) % proteina, (22 do 31) % ugljikohidrata i (15 do 30) % masti. Neke bitne razlike u sastavnicama matične mlijec prikazane su u tablici 1.

Nedavno je utvrđeno da cjelokupni proteini i peptidi daju antioksidativnu aktivnost matične mlijec (102-105). U nedavnom je istraživanju membranskom ultrafiltracijom i anionskom kromatografijom, gel filtracijom i reverzno-faznom visokotlačnom tekućinskom kromatografijom izolirano 29 antioksidativnih peptida iz hidrolizata matične mlijec. Antioksidativna svojstva tih peptida važna su zbog njihove sposobnosti da djeluju kao skupljači slobodnih radikala.

Glavnu hranidbenu vrijednost proteina hrane, pa tako i matične mlijec, određuje njihov aminokiselinski sastav. Stoga određivanje promjene sadržaja aminokiseline može biti učinkovit način za pristup kakvoći ovoga proizvoda. Aminokiseline prisutne u najvišim postotcima su prolin, lizin, glutaminska kiselina, β -alanin, fenilalanin, aspartat i serin (106). Međutim, u istim uzorcima koji su bili pohranjeni na sobnoj temperaturi sadržaj prolina i lizina pokazuje porast u prva tri mjeseca, a nakon 6 do 10 mjeseci njihova je razina bila niža od kontrolnih vrijednosti, što upućuje na proteolitičku enzimsku aktivnost u povoljnim temperaturnim uvjetima tijekom vremena.

Kvantitativni sastav slobodnih aminokiselina (FAA) i ukupnih aminokiselina (TAA) u uzorcima matične mlijec pohranjenima na različitoj temperaturi u različita razdoblja također bi trebalo istražiti. Rezultati su pokazali da je u sveže matičnoj mlijecu prosječna razina FAA 9,21 mg g⁻¹, a razina TAA 111,27 mg g⁻¹. Glavne slobodne aminokiseline u matičnoj mlijec su prolin, glutamin, lizin, glutaminska kiselina, a najbrojnije TAA su asparagin, glutamin, leucin i lizin. Iako koncentracija većine FAA i TAA nije pokazala značajnu razliku tijekom skladištenja, sadržaj ukupnog metionina i slobodnoga glutamina znatno se smanjuje tijekom vremena i može biti parametar za kakvoću matične mlijec.

Osim toga, sveže matična mlijec sadrži masne kiseline (FA) i lipide (3 do 89) %, a liofilizirana matična mlijec sadrži oko (15 do 30) % masti.

Lipidni sastav matične mlijec čine masne kiseline (80 do 85) %, fenoli, (4 do 10) %, vosak (5 do 6) %, steroidi (3 do 4) % i fosfolipidi (0,4 do 0,8) %. FA dio sastoji se od 32 % *trans*-10-hidroksi-2-decenske kiseline (10-HDA), 24 % glukonske kiseline, 22 % 10-hidroksidecenske kiseline (HDA), 5 %

Tablica 2 Pregled bioloških i farmakoloških učinaka matične mlijecu ostvarenih u pokusima na animalnim modelima i u kulturi stanica

Učinak	Reference
<i>Antibakterijski, antivirusni, antiparazitski učinak</i>	
Antibakterijski	6, 61-65, 82
Protugljivični (fungicidni)	6, 80
Antivirusni	43, 80
Aktivnost protiv različitih parazita porodice <i>Trypanosomidae</i>	6, 65
<i>Biostimulirajući i učinak protiv starenja</i>	
Estrogeni i gonadotropni učinci potvrđeni na stanicama i u štakoru	19, 20, 58-60
Povećava rast i težinu pilića, purana, pataka, zečeva, zamoraca, ptica, svinja, teladi, hrčka, miševa i štakora	5, 74
Protutumorski učinak, povećava aktivnost imunosnih stanica i otpornost na stres	22, 35-55
Povećava reproduksijski kapacitet u štakora i ovaca	59, 60
Povećava potrošnju kisika u tkivima <i>in vitro</i> , antihipoksički učinak	49, 66
Protiv neplodnosti muških kunića, poboljšava seksualnu učinkovitost u štakora i hrčka	73
Produljenje života miševa i štakora	41, 42, 45
<i>Imunomodulirani učinci: protutumorski, antialergijski i protuupalni</i>	
Imunostimulirajuća aktivnost u životinja ili u kulturama stanica, povećanje broja leukocita	24, 42, 43, 46-48
Protutumorski učinci u kulturi stanica i životinjskim modelima (<i>per os</i> ili injekcije)	35-41, 43, 45, 50, 51
Sprečava autoimunost u miševa	74
Protuupalni učinci (stanične kulture)	23
<i>Učinci na krvоžilni sustav i srce</i>	
Smanjuje povećani krvni tlak, hipotenzivni učinak, vazodilatacija (na životinjama)	66-71
Antiaterosklerozni učinak: smanjuje razinu kolesterola i triglicerida u krvi, povećava HDL, snižava razinu fibrinogena u plazmi i trombozu	68-71, 74
Kardio-zaštitni učinak (na životinjama), sprječava miokarditis	68-71
Povećava razinu tiroksina, omjer albumina/globulina u krvi i smanjuje razine serumskih proteina nakon oralne primjene u štakora	5
<i>Utjecaj na središnji i vegetativni živčani sustav</i>	
Djeluje na aktivnost središnjeg živčanog sustava, aktivira ga i štiti	29-30
Povećava diferencijaciju moždanih stanica	30, 31
Povećava fosforilaciju središnjeg živčanog sustava povećanjem aktivnosti kolisteraza u mozgu štakora	29
Ima acetil-kolinu slične učinke na crijeva i na živčana vlakna glatkih mišića u dišnom sustavu	25
Umirujući učinak (štakor)	5, 25
<i>Antioksidativni, hepatoprotektivni i zaštitni učinak od zračenja (radioprotektivni)</i>	
Antioksidativni učinak	46-48, 53-55, 76
Zaštita jetara u pokusima na životinjama	52-55
Smanjuje stres i teratogenost, plućni edem i oštećenja jetara ili bubrega u štakora nakon unosa mikotoksina	53-55, 77
Stimulira sintezu DNA u hepatocita i štiti stanice od apoptoze, mitogeni učinak, potiče proliferaciju stanica i povećava proizvodnju albumina	2, 17, 18
Zaštitni učinak od zračenja u pokusima na životinjama	46-49
<i>Drugi učinci</i>	
Sprječava osteoporozu u štakora i potiče formiranje kosti	20, 58
Zaštita kože: potiče izgradnju kolagena u kulturama stanica	19
Hiperglykemijsko djelovanje, sprječava otpornost na inzulin, antidiabetički učinak	32, 33, 34
Smanjuje eksperimentalni kolitis u štakora	77
Antialergijska aktivnost, smanjuje razvoj atopijskog dermatitisa poput kožnih lezija u štakora	24, 56, 57

Tablica 3 Medicinski učinci matične mlječe u ljudi

Uporaba	Reference
Djeca U nedonoščadi ili nedostatnoj prehrani: poboljšanje općeg stanja, povećanje težine, apetita, broja crvenih krvnih stanica i razine hemoglobina	5, 25, 79, 80
Odrasli Poboljšava opće stanje i oporavak starih ljudi od slabosti i problema u menopauzi Protiv stenokardije i nakon srčanog infarkta; arterioskleroze i ateroskleroze; hipertenzija, hipotenzija	73, 74, 78, 82-84, 86 72-74, 86
Protiv bolesti dišnog sustava, astme	86
Protiv bolesti oka, primjerice blepharitisa, konjuktivitisa i oštećenja rožnice, poremećene cirkulacije u oku	88, 90
Biostimulirajući učinak, poboljšava fizičku kondiciju i radnu sposobnost te otpornost na hipoksiju	80, 83
Poboljšava memoriju, neurovegetativnu aktivaciju	83, 86
Protiv dijabetesa tip 1	86, 94-97
Protiv raka	78, 90
Protiv ulkusa želuca i dvanaesnika, želučanih tegoba	87
Pospješuje regeneraciju i zacjeljivanje rana kože	91
Protiv degenerativnih promjena i reumatizma	90
Protiv bradavica, akni, čireva, seboreje, neurodermatitisa	92
Protiv bubrežne disfunkcije	93

dikarboksilne kiseline i od nekoliko drugih kiselina. 10-HDA i HDAA specifične su sastavnice matične mlječe (107). Osim što je najvažniji kriterij kakvoće, HDA može biti i pokazatelj da se radi o krivotvorini. Iz tog je razloga 10-HDA sadržaj prihvaćen kao biljeg za matičnu mlječ i koristi se za analizu njene kakvoće. Međutim, u literaturi su sastav i krajne granice za razinu 10-HDA vrlo široke. Primjerice, Antinelli i sur. (108) pokazali su smanjenje 10-HDA od 0,4 % i 0,6 % u dvama uzorcima matične mlječe pohranjenima na sobnoj temperaturi tijekom 12 mjeseci. Štoviše, zbog svoje promjenjive vrijednosti u svježoj matičnoj mlječi, 10-HDA teško se može koristiti kao pokazatelj svježine. Rezultati HPLC analize i elektroforeze pokazali su da uzorci matične mlječe europskoga podrijetla sadrže manje količine 10-HDA, a to potvrđuje i mjerjenje ukupnih lipida nakon ekstrakcije otapalom (109). Stoga se smatra da bi mjerjenje ukupne razine masnih kiselina mogao biti bolji pokazatelj od određivanja prisutnosti same 10-HDA (95, 110, 111).

Autentičnost proizvodnje matične mlječe može se odrediti ne samo mjeranjem omjera stabilnih izotopa elemenata C i N (112) i određivanjem sastava masnih kiselina u RJ (95, 113) nego i analizom šećera (114).

Zemljopisna autentičnost može se utvrditi i peludnom analizom (115, 116). Omjeri $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ upućuju na zemljopisno podrijetlo uzorka (112).

Količina peluda te vidljivog voska i ostataka ličinki treba biti minimalna (117). Za procjenu kvalitativnih i hranidbenih vrijednosti matične mlječe može poslužiti određivanje razine slobodnog i cjelokupnog triptofana (118).

Prema tome, ključni parametri u istraživanju kakvoće matične mlječe su njena organoleptička svojstva, fizikalno-kemijska svojstva i sastav, kako slijedi: a) sadržaj vode u suhom i zamrznutom uzorku matične mlječe; b) ukupna razina proteina i slobodnih aminokiselina; c) razina ugljikohidrata; d) razina lipida; ukupnih masnih kiselina i slobodnih kiselina; e) 10 HDA; f) minerali; g) kiselost; h) analiza sedimenta; i) furazin; j) moguća kontaminacija.

Za procjenu svježine matične mlječe ili njenih pripravka mogu se rabiti neke od sljedećih metoda: određivanje glukoza oksidaza, furozina ili aktivnosti superoksid dizmutaza (SOD). Određivanje glukoza oksidaza analitički je vrlo jednostavna metoda, primjenjiva u svim laboratorijima. Svakako treba istaknuti da najprije treba istražiti prirodnu varijabilnost tog enzima u svježem proizvodu (119). Marconi i sur. (120) smatraju da se kao biljeg za procjenu svježine matične mlječe može rabiti sadržaj furozina. Vrijednost furozina, proizvoda Maillardove reakcije, u svježim uzorcima matične mlječe izrazito je niska (<10 mg u 100 g proteina) (121), ali se s vremenom te u odnosu na temperaturu povećava. Naime, sadržaj

se može povećati na 500 mg u 100 g proteina nakon 18 mjeseci skladištenja pri sobnoj temperaturi i na 50 mg u 100 g na 4 °C. Uzorci uzeti s polica trgovina pokazali su vrijednosti u rasponu od 40 do 100 mg u 100 g proteina. Nasuprot tome, liofilizirana matična mlječ ima snažnu tendenciju da pojačano formira furozin tijekom skladištenja (121). Osim toga za procjenu svježine matične mlječe korisno je mjeriti i aktivnost enzima SOD (122).

U liofiliziranim uzorcima skladištenjem na sobnoj temperaturi razina furozina može porasti na 500,8 mg u 100 g proteina tijekom 10 mjeseci (121).

Na temelju navedenoga, pripravci koji sadržavaju matičnu mlječ moraju se pripremati uz strogo pridržavanje sanitarno-higijenskih uvjeta i mjera te pod nadzorom stručnjaka kako bi primjena matične mlječe mogla postići svoje djelotvorne učinke.

Zaključne napomene

Mogućnost uporabe matične mlječe temelji se na sljedećim biološkim osobitostima: biostimulativni učinak - sposobnost pojačavanja disanja tkiva, pojačava oksidativnu fosforilaciju, ubrzava izmjenu tvari, povećanje energije i izdržljivosti, stimulira parasympatički centar vegetativnog sustava i pojačava izlučivanje adrealina iz nadbubrežne žlijezde, povećava otpornost na stres i bolesti, pomaže u održavanju i jačanju kose, kožnog tonusa i noktiju, pomaže u regeneraciji stanica i tkiva, smanjuje razinu kolesterola, pozitivno djeluje na krvožilni sustav, stabilizira krvni tlak, poboljšava memoriju (acetil kolin neurotransmiter), stimulira imunosni sustav, potiče apetit, regulira probavu, održava ravnotežu hormona, olakšava menstrualne simptome, pomaže u liječenju impotencije i frigidnosti, otklanja slabost i umor, pozitivno djeluje na artritis, anemiju, mišićnu distrofiju i Parkinsonovu bolest te djeluje antiupalno, antivirusno i antibiotički (vidi Tablicu 2 i Tablicu 3). No pokazalo se da matična mlječ može izazvati i kontaktni dermatitis i anafilaksiju zbog prisutnosti brojnih proteina (84, 123, 124) u pojedinim ljudi, što zahtijeva oprez prilikom njene uporabe. Matična mlječ može se ograničeno uzimati u bolestima kao što je bronhijalna astma u krizi (kap astrigent – ona može dovesti do bronhioktazije), Adisonova bolest, akutne zarazne i bolesti nadbubrežne žljezde te tumor u akutnoj fazi. Matičnu mlječ nije poželjno primjenjivati navečer jer često može prouzročiti različite nuspojave i nesanicu.

Na temelju navedenih značajki matične mlječe, nužno je napraviti izbor dobrih i pogodnih metoda

koje bi bile ključne za njenu standardizaciju, posebice za razinu važnih biološki aktivnih sastavnica, valjanost i kakvoću proizvoda radi što bolje učinkovitosti pripravaka matične mlječe na ljudsko zdravlje i kvalitetu života. Spoznaje o razini glavnih bioloških sastavnica i njihovoj sezonskoj i geografskoj varijabilnosti, njihovoj promjenjivosti tijekom vremena i načinu pravilnog skladištenja te pronalazak sigurne terapeutiske doze važne su u prevenciji i zaštiti od bolesti. Nadalje, spoznajom o ljekovitim osobitostima matične mlječe omogućit će se njihova veća primjena te potaknuti proizvodnja, što će dovesti do ekonomski isplativa pčelarenja. Na temelju promjena sastavnica matične mlječe tijekom vremena, različitog skladištenja, liofilizacije ili podrijetla, nužno je provesti njenu analizu i standardizaciju. A one se trebaju zasnovati na prikupljanju uzorka matične mlječe s različitih hrvatskih područja te na analizi ključnih sastavnica, primjerice na a) sadržaju vode u suhom i zamrznutom uzorku, b) ukupnoj razini proteina i slobodnih aminokiselina, c) razini ugljikohidrata, d) razini lipida, ukupnih masnih kiselina i slobodnih kiselina, e) 10 HDA, f) minerala, g) kiselosti, h) analizi sedimenta, i) furazina te j) moguće kontaminacije.

LITERATURA

- Chandrasekara A, Shahidi F. Bioactivities and antiradical properties of millet grains and hulls. *J Agric Food Chem* 2011;59:9563-71. doi: 10.1021/jf201849d
- Kamakura M. Royalactin induces queen differentiation in honeybees. *Nature* 2011;473:478-83. doi: 10.1038/nature10093
- Vecchi MA, Sabatini AG, Grazia L, Tini V, Zambonelli C. Il contenuto in vitamine come possibile elemento di caratterizzazione della gelatina reale [The content in vitamins as a possible element of characterization of the royal jelly, in Italian]. *Apicoltura* 1988;4:139-46.
- Tamura S, Kono T, Harada C, Yamaguchi K, Moriyama T. Estimation and characterisation of major royaljelly proteins obtained from the honeybee *Apis merifera*. *Food Chem* 2009;114:1491-7. doi: 10.1016/j.foodchem.2008.11.058
- Bogdanov S. Royal Jelly, Bee Brood: Composition, Health, Medicine: A Review [pristup 28. lipnja 2013.]. Dostupno na <http://www.bee-hexagon.net/files/file/fileE/Health/RJBookReview.pdf>
- Fontana R, Mendes MA, De Souza, BM, Konno K, César LM, Malaspina O, Palma MS. Jelleines: a family of antimicrobial peptides from the Royal Jelly of honeybees (*Apis mellifera*). *Peptides* 2004;25:919-28. doi: 10.1016/j.peptides.2004.03.016
- Sabatini AG, Marcazzan G, Caboni MF, Bogdanov S, Almeida-Muradian LB. Quality and standardisation of royal jelly. *JAAS* 2009;1:1-6. doi: 10.3896/IBRA.4.01.1.04

8. Schmitzová J, Klaudiny J, Albert S, Schröder W, Schreckengost W, Hanes J, Júdová J, Simút J. A family of major royal jelly proteins of the honeybee *Apis mellifera* L. *Cell Mol Life Sci* 1998;54:1020-30. PMID: 9791542
9. Simút J, Bíliková K, Kováčová E, Kuzmová Z, Schröder W. Immunochemical approach to detection of adulteration in honey: physiologically active royal jelly protein stimulating TNF-alpha release is a regular component of honey. *J Agric Food Chem* 2004;52:2154-8. doi: 10.1021/jf034777y
10. Albert S, Klaudiny J. The MRJP/YELLOW protein family of *Apis mellifera*: identification of new members in the EST library. *J Insect Physiol* 2004;50:51-9. PMID: 15037093
11. Drapeau MD, Albert S, Kucharski R, Prusko C, Maleszka R. Evolution of the Yellow/Major Royal Jelly Protein family and the emergence of social behavior in honey bees. *Genome Res* 2006;16:1385-94. doi: 10.1101/gr.5012006
12. Schönleben S, Sickmann A, Mueller MJ, Reinders J. Proteome analysis of *Apis mellifera* royal jelly. *Anal Bioanal Chem* 2007;389:1087-93. doi: 10.1007/s00216-007-1498-2
13. Bíliková K, Simút J. New criterion for evaluation of honey: quantification of royal jelly protein apalbumin 1 in honey by ELISA. *J Agric Food Chem* 2010;58:8776-81. doi: 10.1021/jf101583s
14. Kimura M, Kimura Y, Tsumura K, Okihara K, Sugimoto H, Yamada H, Yonekura M. 350-kDa royal jelly glycoprotein (apisin), which stimulates proliferation of human monocytes, bears the beta1-3galactosylated N-glycan: analysis of the N-glycosylation site. *Biosci Biotechnol Biochem* 2003;67:2055-8. PMID: 14520005
15. Li J, Wang T, Zhang Z, Pan Y. Proteomic analysis of royal jelly from three strains of western honeybees (*Apis mellifera*). *J Agric Food Chem* 2007;55:8411-22. doi: 10.1021/jf0717440
16. Ramadan MF, Al-Ghamdi A. Bioactive compounds and health-promoting properties of royal jelly: A review. *J Funct Foods* 2012;4:39-52. doi: 10.1016/j.jff.2011.12.007
17. Kamakura M, Suenobu N, Fukushima M. Fifty-seven-kDa protein in royal jelly enhances proliferation of primary cultured rat hepatocytes and increases albumin production in the absence of serum. *Biochem Biophys Res Commun* 2001;282:865-74. doi: 10.1006/bbrc.2001.4656
18. Kamakura M, Moriyama T, Sakaki T. Changes in hepatic gene expression associated with the hypocholesterolaemic activity of royal jelly. *J Pharm Pharmacol* 2006;58:1683-9. PMID: 17331334
19. Mishima S, Suzuki KM, Isohama Y, Kuratsu N, Araki Y, Inoue M, Miyata T. Royal jelly has estrogenic effects *in vitro* and *in vivo*. *J Ethnopharmacol* 2005;101:215-20. doi: 10.1016/j.jep.2005.04.012
20. Narita Y, Ohta S, Suzuki KM, Nemoto T, Abe K, Mishima S. Effects of long-term administration of royal jelly on pituitary weight and gene expression in middle-aged female rats. *Biosci Biotechnol Biochem* 2009;73:431-3. PMID: 19202272
21. Watanabe K, Shimoto H, Kobori M, Tsushima T, Shinohara K, Kanaeda J, Yonekura M. Stimulation of cell growth in the U-937 human myeloid cell line by honey royal jelly protein. *Cytotechnology* 1998;26:23-7. doi: 10.1023/A:1007928408128
22. Nakaya M, Onda H, Sasaki K, Yukiyoshi A, Tachibana H, Yamada K. Effect of royal jelly on bisphenol A-induced proliferation of human breast cancer cells. *Biosci Biotechnol Biochem* 2007;71:253-5. PMID: 17213647
23. Kohno K, Okamoto I, Sano O, Arai N, Iwaki K, Ikeda M, Kurimoto M. Royal jelly inhibits the production of proinflammatory cytokines by activated macrophages. *Biosci Biotechnol Biochem* 2004;68:138-45. PMID: 14745176
24. Okamoto I, Taniguchi Y, Kunikata T, Kohno K, Iwaki K, Ikeda M, Kurimoto M. Major royal jelly protein 3 modulates immune responses *in vitro* and *in vivo*. *Life Sci* 2003;73:2029-45. doi: 10.1016/S0024-3205(03)00562-9
25. Salazar-Olivo LA, Paz-González V. Screening of biological activities present in honeybee (*Apis mellifera*) royal jelly. *Toxicol In Vitro* 2005;19:645-51. doi: 10.1016/j.tiv.2005.03.001
26. Inoue S, Koya-Miyata S, Ushio S, Iwaki K, Ikeda M, Kurimoto M. Royal Jelly prolongs the life span of C3H/HeJ mice: correlation with reduced DNA damage. *Exp Gerontol* 2003;38:965-9. PMID: 12954483
27. Oršolić N, Bašić I. Honey bee products and their polyphenolic compounds in treatment of diabetes. U: Govil JN, Singh VK, Bhardwaj R, urednici. *Phytopharmacology and Therapeutic Values IV*. Rec Prog Med Plants 2008;22:455-553.
28. Koya-Miyata S, Okamoto I, Ushio S, Iwaki K, Ikeda M, Kurimoto M. Identification of a collagen production-promoting factor from an extract of royal jelly and its possible mechanism. *Biosci Biotechnol Biochem* 2004;68:767-73. PMID: 15118301
29. Hashimoto M, Kanda M, Ikeno K, Hayashi Y, Nakamura T, Ogawa Y, Fukumitsu H, Nomoto H, Furukawa S. Oral administration of royal jelly facilitates mRNA expression of glial cell line-derived neurotrophic factor and neurofilament H in the hippocampus of the adult mouse brain. *Biosci Biotechnol Biochem* 2005;69:800-5. PMID: 15849420
30. Hattori N, Nomoto H, Fukumitsu H, Mishima S, Furukawa S. Royal jelly and its unique fatty acid, 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid, promote neurogenesis by neural stem/progenitor cells *in vitro*. *Biomed Res* 2007;28:261-6. PMID: 18000339
31. Hattori N, Ohta S, Sakamoto T, Mishima S, Furukawa S. Royal jelly facilitates restoration of the cognitive ability in trimethyltin-intoxicated mice. *Evid Based Complement Alternat Med* 2011;2011:165968. doi: 10.1093/ecam/nep029
32. Fujii A, Kobayashi S, Kuboyama N, Furukawa Y, Kaneko Y, Ishihama S, Yamamoto H, Tamura T. Augmentation of wound healing by royal jelly (RJ) in streptozotocin-diabetic rats. *Jpn J Pharmacol* 1990;53:331-7. PMID: 2391765
33. Erski-Biljić M, Biljić Erski A, Rajić Savić N. Matični mleč - kraljevski gel (Apiterapija, knjiga 2.). Beograd: Grafos; 2003.
34. Nomura M, Maruo N, Zamami Y, Takatori S, Doi S, Kawasaki H. [Effect of long-term treatment with royal jelly on insulin resistance in Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty (OLETF) rats, in Japanese]. *Yakugaku Zasshi* 2007;127:1877-82. PMID: 17978564
35. Tamura T, Fujii A, Kuboyama N. [Antitumor effects of royal jelly, in Japanese]. *Nippon Yakurigaku Zasshi* 1987;89:73-80. PMID: 3570105
36. Tamura T, Fujii A, Kuboyama N. Effects of royal jelly on experimental transplantable tumours. U: The XXXth International Apicultural Congress; 10.-16. listopada 1985.

- Nagoya, Japan. Bucharest: Apimondia Publishing House; 1985. str. 474-7.
37. Townsend GF, Morgan JF, Hazlett B. Activity of 10-hydroxydecanoic acid from royal jelly against experimental leukaemia and ascitic tumors. *Nature* 1959;183:1270-1. doi: 10.1038/1831270a0
38. Townsend GF, Morgan JF, Hazlett B, Hazlett B, Morton H, Shuel RW. Studies on the *in vitro* antitumor activity of fatty acid and 10-hydroxy-2-decanoic acid from royal jelly. *Cancer Res* 1960;20:503-10.
39. Oršolić N, Knežević A, Šver L, Terzić S, Hackenberger BK, Bašić I. Influence of honey bee products on transplantable murine tumors. *Vet Comp Oncol* 2003;1:216-26. doi: 10.1111/j.1476-5810.2003.00029.x
40. Oršolić N, Sacases F, Percie Du Sert P, Bašić I. Antimetastatic ability of honey bee products. *Period Biol* 2007;109:173-80.
41. Oršolić N, Terzić S, Šver L, Bašić I. Honey-bee products in preventive and/or therapy of murine transplantable tumours. *J Sci Food Agric* 2005;85:363-70. doi: 10.1002/jsfa.2041
42. Šver L, Oršolić N, Tadić Z, Njari B, Valpotić I, Bašić I. A royal jelly a new potential immunomodulator in rats and mice. *Comp Immun Microbiol Infect Dis* 1996;19:31-8. PMID: 8654043
43. Vučević D, Mellou E, Vasilijic S, Gasic S, Ivanovski P, Chinou I, Colic M. Fatty acids isolated from royal jelly modulate dendritic cell-mediated immune response *in vitro*. *Int Immunopharmacol* 2007;7:1211-20. doi: 10.1016/j.intimp.2007.05.005
44. Bincoletto C, Eberlin S, Figueiredo CA, Luengo MB, Queiroz ML. Effects produced by Royal Jelly on haematopoiesis: relation with host resistance against Ehrlich ascites tumour challenge. *Int Immunopharmacol* 2005;5:679-88. doi: 10.1016/j.intimp.2004.11.015
45. Allavena P, Mantovani A. Immunology in the clinic review series; focus on cancer: tumour-associated macrophages: undisputed stars of the inflammatory tumour microenvironment. *Clin Exp Immunol*. 2012;167:195-205.
46. Emori Y, Oka H, Kobayashi N, Ohya O, Tamaki H, Hayashi H, Nomoto K. [Protective effect of royal jelly on immune dysfunction in aged mice, in Japanese]. *Biotherapy (Tokyo)* 1999;13:281-7.
47. Emori Y, Oka H, Ohya O, Tamaki H, Hayashi H, Nomoto K. [The protective effect of royal jelly against the hemopoiesis dysfunction in X-irradiated mice, in Japanese]. *Biotherapy (Tokyo)* 1998;12:313-9.
48. Emori Y, Oka H, Ohya O, Tamaki H, Hayashi H, Nomoto K. [The protective effect of royal jelly on cecal ligation and puncture-induced sepsis in X-irradiated mice, in Japanese]. *Biotherapy (Tokyo)* 1998;12:1143-8.
49. Krylov V, Koryagin AS, Nikolaeva AA, Sinelschikov AD, Ovoschnikova LV. Experiments on therapeutic effects of preparations of beekeeping products on radiation illnesses. *Mellifera* 2002;2:58-61.
50. Gore AC, editor. Endocrine-Disrupting Chemicals: From Basic Research to Clinical Practice. Totowa (NJ): Humana Press Inc.; 2007.
51. O'Connor JC, Chapin RE. Critical evaluation of observed adverse effects of endocrine active substances on reproduction and development, the immune system, and the nervous system. *Pure Appl Chem* 2003;75:2099-123. doi: 10.1351/pac200375112099
52. Karadeniz A, Simsek N, Karakus E, Yildirim S, Kara A, Can I, Kisa F, Emre H, Turkeli M. Royal jelly modulates oxidative stress and apoptosis in liver and kidneys of rats treated with cisplatin. *Oxid Med Cell Longev* 2011;2011:981793. doi: 10.1155/2011/981793
53. Cemek M, Aymelev F, Büyükkokuroğlu ME, Karaca T, Büyükbelen A, Yilmaz F. Protective potential of Royal Jelly against carbon tetrachloride induced-toxicity and changes in the serum sialic acid levels. *Food Chem Toxicol* 2010;48:2827-32. doi: 10.1016/j.fct.2010.07.013
54. Kanbur M, Eraslan G, Beyaz L, Silici S, Liman BC, Altinordulu S, Atasever A. The effects of royal jelly on liver damage induced by paracetamol in mice. *Exp Toxicol Pathol* 2009;61:123-32. doi: 10.1016/j.etp.2008.06.003
55. Çavuşoğlu K, Yapar K, Yalçın E. Royal jelly (honey bee) is a potential antioxidant against cadmium-induced genotoxicity and oxidative stress in albino mice. *J Med Food* 2009;12:1286-92. doi: 10.1089/jmf.2008.0203
56. Oka H, Emori Y, Kobayashi N, Hayashi Y, Nomoto K. Suppression of allergic reactions by royal jelly in association with the restoration of macrophage function and the improvement of Th1/Th2 cell responses. *Int Immunopharmacol* 2001;1:521-32. PMID: 11367535
57. Taniguchi Y, Kohno K, Inoue S, Koya-Miyata S, Okamoto I, Arai N, Iwaki K, Ikeda M, Kurimoto M. Oral administration of royal jelly inhibits the development of atopic dermatitis-like skin lesions in NC/Nga mice. *Int Immunopharmacol* 2003;3:1313-24. doi: 10.1016/S1567-5769(03)00132-2
58. Hidaka S, Okamoto Y, Uchiyama S, Nakatsuma A, Hashimoto K, Ohnishi ST, Yamaguchi M. Royal jelly prevents osteoporosis in rats: beneficial effects in ovariectomy model and in bone tissue culture model. *Evid Based Complement Alternat Med* 2006;3:339-48. doi: 10.1093/ecam/nel019
59. Husein MQ, Kridli RT. Reproductive responses following royal jelly treatment administered orally or intramuscularly into progesterone-treated Awassi ewes. *Anim Reprod Sci* 2002;74:45-53. PMID: 12379374
60. Husein MQ, Haddad SG. A new approach to enhance reproductive performance in sheep using royal jelly in comparison with equine chorionic gonadotropin. *Anim Reprod Sci* 2006;93:24-33. PMID: 16055281
61. Boman HG. Peptide antibiotics: holy or heretic grails of innate immunity? *Scand J Immunol* 1996;43:475-82. PMID: 8633204
62. Papo N, Shai Y. Effect of drastic sequence alteration and D-amino acid incorporation on the membrane binding behavior of lytic peptides. *Biochemistry* 2004;43:6393-403. doi: 10.1021/bi049944h
63. Fujiwara S, Imai J, Fujiwara M, Yaeshima T, Kawashima T, Kobayashi K. A potent antibacterial protein in royal jelly. Purification and determination of the primary structure of royalisin. *J Biol Chem* 1990;265:11333-7. PMID: 2358464
64. Genç M, Aslan A. Determination of trans-10-hydroxy-2-decanoic acid content in pure royal jelly and royal jelly products by column liquid chromatography. *J Chromatogr A* 1999;839:265-8. PMID: 10327631
65. Boukraâ L, Meslem A, Benhanifia M, Hammoudi SM. Synergistic effect of starch and royal jelly against *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. *J Altern Complement Med* 2009;15:755-7. doi: 10.1089/acm.2008.0483

66. Okuda H, Kameda K, Morimoto C, Matsuura Y, Chikaki M, Ming J. Studies on insulinlike substances in royal jelly and other substances in royal jelly which inhibit angiotensin-converting enzyme. *Honeybee Sci* 1998;19:9-14.
67. Matsui T, Yukiyoshi A, Doi S, Sugimoto H, Yamada H, Matsumoto K. Gastrointestinal enzyme production of bioactive peptides from royal jelly protein and their antihypertensive ability in SHR. *J Nutr Biochem* 2002;13:80-6. PMID: 11834223
68. Tokunaga KH, Yoshida C, Suzuki KM, Maruyama H, Futamura Y, Araki Y, Mishima S. Antihypertensive effect of peptides from royal jelly in spontaneously hypertensive rats. *Biol Pharm Bull* 2004;27:189-92. PMID: 14758031
69. Takaki-Doi S, Hashimoto K, Yamamura M, Kamei C. Antihypertensive activities of royal jelly protein hydrolysate and its fractions in spontaneously hypertensive rats. *Acta Med Okayama* 2009;63:57-64. PMID: 19247423
70. Morita H, Ikeda T, Kajita K, Fujioka K, Mori I, Okada H, Uno Y, Ishizuka T. Effect of royal jelly ingestion for six months on healthy volunteers. *Nutr J* 2012;11:77. doi:10.1186/1475-2891-11-77
71. Guo H, Saiga A, Sato M, Miyazawa I, Shibata M, Takahata Y, Morimatsu F. Royal jelly supplementation improves lipoprotein metabolism in humans. *J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo)* 2007;53:345-8. PMID: 17934240
72. Vittek J. Effect of royal jelly on serum lipids in experimental animals and humans with atherosclerosis. *Experientia* 1995;51:927-35. doi: 10.1007/BF01921742
73. Elnagar S. Royal jelly counteracts bucks' "summer infertility". *Anim Repr Sci* 2010;121:174-80. doi: 10.1016/j.anireprosci.2010.05.008
74. Mannoor MK, Shimabukuro I, Tsukamoto M, Watanabe H, Yamaguchi K. Honeybee royal jelly inhibits autoimmunity in SLE-prone NZB x NZW F1 mice. *Lupus* 2009;1:44-52. doi: 10.1177/0961203308094765
75. Poplawsky A. Food for thought: royal jelly for the people. *The Central Sulcus* 2008;4:3-4.
76. Abdel-Wahhab MA, El-Nekeety AA, Abbas NF, El-Kholy W, Amra HA, Ebaid A. Efficacy of royal jelly against fumonisin-induced oxidative stress in rats. *Toxicol Lett* 2006;164(Supplement):S229-30.
77. Karaca T, Bayiroglu F, Yoruk M, Kaya MS, Uslu S, Comba B, Mis L. Effect of royaljelly on experimental colitis induced by acetic acid and alteration of mast cell distribution in the colon of rats. *Eur J Histochem* 2010;54:e35. PMID: 21263740
78. Sugiyama T, Takahashi K, Mori H. Royal jelly acid, 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid, as a modulator of the innate immune responses. *Endocr Metab Immune Disord Drug Targets* 2012;12:368-76. PMID: 23061418
79. King DS, Baskerville R, Hellsten Y, Senchina DS, Burke LM, Stear SJ, Castell LM. A-Z of nutritional supplements: dietary supplements, sports nutrition foods and ergogenic aids for health and performance-Part 34. *Br J Sports Med* 2012;46:689-90. doi: 10.1136/bjsports-2012-091314
80. Cherniack EP. Bugs as drugs, Part 1: Insects: the "new" alternative medicine for the 21st century? *Altern Med Rev* 2010;15:124-35. PMID: 20806997
81. Boukraâ L, Sulaiman SA. Rediscovering the antibiotics of the hive. *Recent Pat Antiinfect Drug Discov* 2009;4:206-13. PMID: 19673699
82. Viuda-Martos M, Ruiz-Navajas Y, Fernández-López J, Pérez-Alvarez JA. Functional properties of honey, propolis, and royal jelly. *J Food Sci* 2008;73:R117-24. doi: 10.1111/j.1750-3841.2008.00966.x
83. Miyata T. Pharmacological basis of traditional medicines and health supplements as curatives. *J Pharmacol Sci* 2007;103:127-31. PMID: 17287592
84. Dzopalic T, Vucevic D, Tomic S, Djokic J, Chinou I, Colic M. 3,10-Dihydroxy-decanoicacid, isolated from royal jelly, stimulates Th1 polarising capability of human monocyte-derived dendritic cells. *Food Chem* 2011;126:1211-7. doi: 10.1016/j.foodchem.2010.12.004
85. Takahama H, Shimazu T. Food-induced anaphylaxis caused by ingestion of royal jelly. *J Dermatol* 2006;33:424-6. PMID: 16700835
86. Shkenderov S, Ivanov T. Peclni Produkti [The Bee Products, in Bulgarian]. Zemizdat (Abstract in Honey bibliography)1983. 1-238.
87. Ghosh S, Playford RJ. Bioactive natural compounds for the treatment of gastrointestinal disorders. *Clin Sci (London)* 2003;104:547-56. PMID: 12641494
88. Mozherenkov VP, Miniaeva TG. [The use of products from bee raising in ophthalmology and otolaryngology, in Russian]. *Med Sestra* 1991;50:47-51. PMID: 1803198
89. Popescu MP, Alexandra D, Popescu M. [Royal jelly and its use in ophthalmology, in Romanian]. *Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Ser Oftalmol* 1987;31:53-6. PMID: 2955470
90. Yang XY, Yang DS, Wei Z, Wang JM, Li CY, Ye H, Lei KF, Chen XF, Shen NH, Jin LQ, Wang JG. 10-Hydroxy-2-decenoic acid from royal jelly: A potential medicine for RA. *J Ethnopharmacol* 2010;128:314-21. doi: 10.1016/j.jep.2010.01.055
91. Rustogi R, Mill J, Fraser JF, Kimble RM. The use of Acticoat™ in neonatal burns. *Burns* 2005;31:878-82. doi: 10.1016/j.burns.2005.04.030
92. Hayashi T, Takamatsu N, Nakashima T, Arita T. Immunological characterization of honey proteins and identification of MRJP 1 as an IgE-binding protein. *Biosci Biotechnol Biochem* 2011;75:556-60. PMID: 21389615
93. Silici S, Ekmekcioglu O, Kanbur M, Deniz K. The protective effect of royal jelly against cisplatin-induced renal oxidative stress in rats. *World J Urol* 2011;29:127-32. doi: 10.1007/s00345-010-0543-5
94. Siavash M, Shokri S, Haghghi S, Mohammadi M, Shahtalebi MA, Farajzadehgan Z. The efficacy of topical Royal Jelly on diabetic foot ulcers healing: A case series. *J Res Med Sci* 2011;16:904-9. PMID: 22279458
95. Lercker G, Caboni MF, Vecchi MA, Sabatini AG, Nanetti A. Characterization of the main constituents of royal jelly 410. *Apicoltura* 1992;8:27-37.
96. Oribe E, Arioka T, Fukuda K, Tatefuji T, Hashimoto K, Maeda K. Moisturizing effect of royal jelly extract and its mechanism on skin. *J Dermatol* 2010;37:77.
97. Abdelatif M, Yakoot M, Etmaan M. Safety and efficacy of a new honey ointment on diabetic foot ulcers: a prospective pilot study. *J Wound Care* 2008;17:108-10. PMID: 18376651
98. Planta von A. [Über den Futtersaft der Bienen, in German]. *Hoppe-Seylers Zeitsch Physiol Chem* 1888;12:327-54.
99. Lercker G. [La gelatina reale: composizione, autenticità ed adulterazione, in Italian]. U: Atti del Convegno "Strategie per

- la valorizzazione dei prodotti dell'alveare". Campobasso: Università degli Studi del Molise; 2003. str. 67-81.
100. Bogdanov S, Bieri K, Gremaud G, Iff D, Känzig A, Seiler K, Stöckli H, Zürcher K. Swiss Food Manual: Gelée Royale. Berne: Bienenprodukte, BAG, Swiss Federal Office for Public Health; 2004.
101. Li Jk, Wang T, Peng Wj. Comparative analysis of the effects of different storage conditions on major royal jelly proteins. *J Apicul Res* 2007;46:73-80.
102. Kosińska, A, Karamać M, Penkacik K, Urbalewicz A, Amarowicz R. Interactions between tannins and proteins isolated from broad bean seeds (*Vicia faba Major*) yield soluble and non-soluble complexes. *Eur Food Res Technol* 2011;233:213-22.
103. Nagai T, Inoue R. Preparation and the functional properties of water extract and alkaline extract of royal jelly. *Food Chem* 2004;84:181-6. doi: 10.1016/S0308-8146(03)00198-5
104. Samaranayaka AGP, Li-Chan ECY. Food-derived peptidic antioxidants: A review of their production, assessment, and potential applications. *J Funct Foods* 2011;3:229-54. doi: 10.1016/j.jff.2011.05.006
105. Shahidi F, Zhong Y. Revisiting the polar paradox theory: a critical overview. *J Agric Food Chem* 2011;59:3499-504. doi: 10.1021/jf104750m
106. Boselli E, Caboni MF, Sabatini AG, Marcazzan GL, Lercker G. Determination and changes of free amino acids in royal jelly during storage. *Apidologie* 2003;34:129-37. doi: 10.1051/apido:2003011
107. Terada Y, Narukawa M, Watanabe T. Specific hydroxy fatty acids in royal jelly activate TRPA1. *J Agric Food Chem* 2011;59:2627-35. doi: 10.1021/jf1041646
108. Antinelli JF, Zeggane S, Dav Ico R, Rognone C, Faucon JP, Lizzani L. Evaluation of (E)-10-hydroxydec-2-enoic acid as a freshness parameter for royal jelly. *Food Chem* 2003;80:85-9. doi: 10.1016/S0308-8146(02)00243-1
109. Ferioli F, Marcazzan GL, Caboni MF. Determination of (E)-10-hydroxy-2-decenoic acid content in pure royal jelly: A comparison between a new CZE method and HPLC. *J Sep Sci* 2007;30:1061-9. PMID: 17566341
110. Lercker G, Caboni MF, Conti LS, Ruini F, Giordani G. Components of royal jelly: I. Identification of the organic acids. *Lipids* 1981;16:912-9. doi: 10.1007/BF02534997
111. Lercker G, Caboni MF, Conti LS, Ruini F, Giordani G. Components of royal jelly: II. The lipid fraction, hydrocarbons and sterols. *J Apicul Res* 1982;21:178-84.
112. Lercker G, Caboni MF, Vecchi MA, Sabtini AG, Nanetti, A. [Caratterizzazione dei principali costituenti dellagelatina reale, in Italian]. *Apicoltura* 1993;8:27-37.
113. Stocker A. Isolation and characterisation of substances from Royal Jelly. [PhD thesis]. Orléans: Université d'Orléans; 2003.
114. Howe SR, Dimick PS, Benton AW. Composition of freshly harvested and commercial royal jelly. *J Apicul Res* 1985;24:52-61.
115. Daniele G, Casabianca HH. Sugar composition of French Royal Jelly for comparison with commercial and artificial sugar samples. *Food Chem* 2012;134:1025-9. doi: 10.1016/j.foodchem.2012.03.008
116. Ricciardelli D'Albore G. [Analisi microscopica del miele edella gelatina reale: possibilità di applicazione e limiti, in Italian]. *Boll Acc Gioenia Sci Nat Catania* 1986;19:45-60.
117. Ricciardelli D'Albore G, Battaglini M, Bernardini M. [Origine géographique de la Gelée royale, in Italian]. *Apidologie* 1978;9:1-17. doi: 10.1051/apido:19780101
118. Serra Bonvehi J. Sugar, acidity and pH royal jelly. Determination of tryptophan in bee pollen and royal jelly by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection. *Ann Bromatol* 1992;44:65-9.
119. Zhang JZ, Xue XF, Zhou JH, Chen F, Wu LM, Li Y, Zhao J. Determination of tryptophan in bee pollen and royal jelly. *Biomed Chromatogr* 2009;23:994-8. doi: 10.1002/bmc.1213
120. Boselli E, Caboni MF, Lercker G, Marcazzan GL, Sabatini AG, Baggio A, Prandin L. [Valutazione di produzioni apistiche: Gelatina reale e cera, in Italian]. U: Sabatini AG, Bolchi Serrini G, Frilli F, Porrini C, editors. Il ruolo della ricerca in apicoltura. Bologna: Litosei; 2002. str. 321-9.
121. Marconi E, Caboni MF, Messia MC, Panfili G. Furosine: A suitable marker for assessing the freshness of royal jelly. *J Agric Food Chem* 2002;50:2825-9. PMID: 11982406
122. Messia MC, Caboni MF, Marconi E. Storage stability assessment of freezedried royal jelly by furosine determination. *J Agric Food Chem* 2005;53:4440-3. PMID: 15913307
123. Zheng HQ, Hu FL, Dietemann V. Changes in composition of royal jelly harvested at different times: consequences for quality standards. *Apidologie* 2011;42:39-47. doi: 10.1051/apido/2010033
124. Rosmilah M, Shahnaz M, Patel G, Lock J, Rahman D, Masita A, Noormalin A. Characterization of major allergens of royal jelly *Apis mellifera*. *Trop Biomed* 2008;25:243-51. PMID: 19287364

Summary

ROYAL JELLY: COMPONENT EFFICIENCY, ANALYSIS, AND STANDARDISATION

Royal jelly is a viscous substance secreted by the hypopharyngeal and mandibular glands of worker honeybees (*Apis mellifera*) that contains a considerable amount of proteins, free amino acids, lipids, vitamins, sugars, and bioactive substances such as 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid, antibacterial protein, and 350-kDa protein. These properties make it an attractive ingredient in various types of healthy foods. This article brings a brief review of the molecular mechanisms involved in the development of certain disorders that can be remedied by royal jelly, based on a selection of *in vivo* and *in vitro* studies. It also describes current understanding of the mechanisms and beneficial effects by which royal jelly helps to combat aging-related complications. Royal jelly has been reported to exhibit beneficial physiological and pharmacological effects in mammals, including vasodilative and hypotensive activities, antihypercholesterolemic activity, and antitumor activity. As its composition varies significantly (for both fresh and dehydrated samples), the article brings a few recommendations for defining new quality standards.

KEY WORDS: *functional food, quality standardisation, chemical composition, bee products*

CORRESPONDING AUTHOR:

Nada Oršolić
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Zavod za animalnu fiziologiju
Rooseveltov trg 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: norsolic@yahoo.com